

Rutiner och arbetsordning efterkoll av cataractoperation

Efter behandling 2-4 veckor (optiker)

- Autorefraktor
- Tonus (tonus kan mätas 1 vecka efter operation)
- Visus okorrigerad
- Visus m autorefraktorvärde

Yttre inspektion omfattar bedömning av:

- Conjungtiva
- Snitt
- Cornea
- Främre kammare
- IOL

Åtgärder:

Om visus ej är bättre än förväntat

→ Kontakta oss

Allt u.a

→ Informera och rekommendera att boka tid hos optiker igen 6-8 veckor efter operationen för ögonhälsoundersökning/synundersökning för utprovning av nya glasögon.

Det är fortfarande viktigt att gå till optikern med jämna mellanrum även om man ser bra, för att upptäcka om andra ögonsjukdomar uppkommer.

Lågt tryck (dvs lägre än "normalt")

- Eventuellt snittet läcker
- **Kontakta oss direkt**

Dimsyn

- Oftast högt tryck, om tonus är upp till 8 mmHg högre än ursprungstryck (innan operation).
- **Kontakta oss direkt**

Rött öga och värk

- Inflammation
- **Kontakta oss direkt**

Vänd!

Svullen cornea

- ödem på grund av lång operationstid, patienten ser då disigt
- Kontakta oss

Linsmaterial kvar i främre kammaren

- Kontakta oss

Ca 20 % har maculaödem ungefär 2 månader efter operation

- Kontakta oss

Blod i främre kammaren

- Kontakta oss

Efterstarr

- Kan tas bort tidigast 2 månader efter operation, anteckna på remissvaret och återkalla patienten efter 6-12 månader.

Om läkarbesök ska bokas

- Kontakta oss via telefon för att direkt få tid till patienten och anteckna detta på remissvaret.

Droppar som normalt ordineras efter operation, 3 gånger dagligen i 3 veckor:

Isopto Maxidex = Antiinflammatorisk droppe efter operation (kan höja trycket i ögat).

Nevanac = Förbygger CME

Fuktdroppar vid behov. (Eftersom snittet är upphöjt spricker tårfilmen där, vid blinkning upplever därför många ögontorrhet)

Direktnummer **ENDAST** för optiker, **ej** för patienter:

010-244 18 11	Reception
010-244 18 18	Anette Palmér, Vårdadministratör
010-244 18 16	Ann-Marie Kveldstad, Vårdadministratör